

BẢNG TÍNH TOÁN ĐỘ ĐAU ĐÓN KHI BỊ CÔN TRÙNG ĐỐT

Một nhà nghiên cứu ở Arizona (Mỹ) đã đưa ra bảng tính độ đau đón khi bị côn trùng đốt, giúp bạn nhận biết và tránh xa các loài côn trùng có khả năng "sát thương" cao.

Justin Schmidt, một nhà nghiên cứu đến từ Viện Sinh học Southwestern (Arizona, Mỹ) đã khảo sát và đưa ra bảng tính toán độ đau khi bị côn trùng đốt, với mức độ từ 0 (không gây đau đón) tới 4 (cực kỳ đau đón, đau đón không thể chịu nổi).

Schmidt cho rằng, ở mức độ 1, sự đau đón có thể khá giống một vết cắt ngọt nhưng không đủ để làm bạn đánh rơi một chiếc cốc khi đang cầm. Còn ở mức độ 4, sự đau đón giống như một dòng điện 20.000 volts đi qua cơ thể người - sự đau đón khiến bạn không những không đủ sức để cầm chiếc cốc, mà thậm chí còn muốn ném nó đi cho đỡ đau.

Bằng cách thử nghiệm ngay trên chính bản thân với vết đốt từ 150 loài côn trùng khác nhau, anh đã đưa ra bảng xếp hạng sau:

Kiến lửa: Mức độ 1 (đau đón kéo dài từ 2 - 4 phút)

Ong mật: Mức độ 2 (đau đón có thể kéo dài tới 10 phút)

Ong nghệ Đức: Mức độ 2 (đau hơn vết đốt ong mật, có thể đau trong vòng 5 phút)

Kiến nhung: Mức độ 3 (đau đón có thể kéo dài tới 30 phút)

Thiên địch của loài nhện Tarantula (Tarantula hawk): Mức độ 4 (dù chỉ kéo dài 3 phút nhưng cực kỳ đau đón)

Kiến đầu đạn: Mức độ 4 (đau đón kéo dài từ 12 - 24 giờ)

Tất nhiên, kết quả của bảng tính đau đón khi côn trùng đốt này dựa trên trải nghiệm cá nhân. Và cũng thật khó để giới khoa học "dám" làm khảo sát điều này qua thử nghiệm tình nguyện.