

KHÁNG SINH LÀM TĂNG NGUY CƠ BỆNH CHÀM

Một nghiên cứu mới tại Anh phát hiện, trẻ dùng thuốc kháng sinh trong năm đầu đời thì nguy cơ mắc bệnh chàm tăng 40%, theo Daily Mail ngày 20/6.

>>> Phát hiện protein gây bệnh chàm

Cần lưu ý khi cho trẻ dùng thuốc kháng sinh. (Ảnh: hdwallpapers.in)

Nhóm nghiên cứu tại Anh thuộc Trường cao đẳng King, Trường đại học Nottingham và Bệnh viện Aberdeen Royal đã xem xét lại 20 cuộc nghiên cứu với khoảng 293.000 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Đây là cuộc xem xét đầu tiên có quy mô lớn và hệ thống về mối quan hệ giữa việc dùng kháng sinh trong năm đầu đời của trẻ và nguy cơ mắc bệnh chàm.

Họ nhận thấy những trẻ dùng thuốc kháng sinh trong năm đầu đời thì tăng 40% nguy cơ mắc bệnh chàm, đặc biệt kháng sinh phổ rộng càng có tác động rõ rệt.

Nên cân nhắc cho trẻ dưới 1 tuổi dùng thuốc kháng sinh, đặc biệt là những trẻ mà lịch sử gia đình mắc bệnh chàm hoặc các bệnh dị ứng, theo tiến sĩ Carsten Flohr, một thành viên của nhóm nghiên cứu.