

KHÁNG SINH AZITHROMYCIN CÓ THỂ GÂY NGUY CƠ TỬ VONG

Tạp chí New England Journal of Medicine mới đây đưa tin, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện việc sử dụng kháng sinh Azithromycin làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch.

Loại kháng sinh này vốn được dùng trong điều trị viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tai và các bệnh lây qua đường tình dục.

Tiến hành khảo sát bằng cách cho các bệnh nhân dùng Azithromycin trong 5 ngày đầu. Các nhà khoa học nhận thấy nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp 2,5 lần so với người không uống loại kháng sinh này.

Ngoài ra họ còn tiến hành so sánh trên 8000 bệnh nhân sử dụng kháng sinh Azithromycin và hàng triệu bệnh nhân sử dụng kháng sinh Amoxicillin hoặc không dùng bất kỳ loại kháng sinh nào.

Kết quả cho thấy, nguy cơ tử vong ở người dùng Azithromycin tăng nhẹ so với những người còn lại.

Tuy nhiên, tiến sĩ Gregg C. Fonarow, giám đốc chương trình phòng ngừa tim mạch UCLA cho biết cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để xác nhận chính xác nhận định trên.