

## BIỆN PHÁP MỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THẬN

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã cho phép sử dụng thuốc uống Votrient (pazopanib) để điều trị ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn cuối. Thuốc mới được thiết kế nhằm ngăn ngừa tăng sinh mạch nuôi dưỡng khối u.

Theo FDA, khoảng 49.000 người có chẩn đoán

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã cho phép sử dụng thuốc uống Votrient (pazopanib) để điều trị ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn cuối. Thuốc mới được thiết kế nhằm ngăn ngừa tăng sinh mạch nuôi dưỡng khối u.

Theo FDA, khoảng 49.000 người có chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào thận và 11.000 người đã tử vong trong năm nay.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng ở 435 bệnh nhân đã cho thấy thời gian trung bình trước khi khối u tái phát hoặc trước khi tử vong ở người uống Votrient là 9,2 tháng, so với 4,2 tháng ở nhóm không uống thuốc.

Phản ứng phụ do uống Votrient có thể gồm tiêu chảy, tăng huyết áp, thay đổi màu tóc, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, đau bụng và nhức đầu. Thuốc cũng có thể gây độc cho gan, vì vậy người uống Votrient nên được theo dõi chặt chẽ chức năng gan. Thuốc cũng có thể gây ra các vấn đề về nhịp tim. Do gây hại đối với thai nhi, nên không được sử dụng Votrient ở phụ nữ mang thai.