

# AMIĂNG CỰC KỲ ĐỘC HẠI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 100.000 người chết do các bệnh ung thư có liên quan đến amiăng (loại quặng có thể kéo thành sợi), hội chứng của nó có thể kéo dài từ 10, 20, hoặc 30 năm trước khi phát bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 100.000 người chết do các bệnh ung thư có liên quan đến amiăng (loại quặng có thể kéo thành sợi), hội chứng của nó có thể kéo dài từ 10, 20, hoặc 30 năm trước khi phát bệnh.

"Amiăng trắng" hiện vẫn đang được sử dụng để làm tôn lợp nhà tại nhiều nước đang phát triển.

Trên thực tế, amiăng có tới 6 loại, trong đó loại độc hại nhất có tên khoa học là crocidolite, hay còn gọi là "amiăng xanh", đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Loại ít độc hơn cả là chrysolite, còn gọi là "amiăng trắng", hiện vẫn đang được sử dụng để làm tôn lợp nhà, gioăng đệm, hoặc ống dẫn nước.

Ban Asbestos (một mạng lưới quốc tế, hiện đang đấu tranh đòi cấm sử dụng amiăng trên toàn thế giới) cho biết việc sản xuất quặng sợi này đang gia tăng tại một số nước, nhất là các nước thuộc thế giới thứ ba.

Tuy nhiên, tình hình đáng lo ngại hơn ở nhiều nước châu Phi do việc sử dụng amiăng có giới hạn chưa được quan tâm đúng mức./.